



VACCUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO ESCOLAR, GRADOS K-12

Julio 1, 2013 – Junio 30, 2014

VACUNA	Kínder-1 ^{er} Grado	2 ^o -4 ^o Grado	5 ^o -6 ^o Grado	7 ^o -12 ^o Grado
Hepatitis B	3 dosis Consulte los intervalos mínimos en la página 2 La 3ra dosis debe administrarse a partir de las 24 semanas de edad			3 dosis Consulte los intervalos mínimos en la página 2 La 3ra dosis debe administrarse a partir de los 4 meses de edad
Difteria, Tétanos y Tos ferina (DTaP/DT/Td/Tdap)	5 dosis (se requieren 4 dosis <i>si</i> la 4 ^{ta} dosis es administrada a partir de los 4 años) además de requerirse 1 dosis de Tdap para estudiantes en los grados 6^o-11^o si tienen 11 años o más de edad			
Polio (IPV o OPV)	4 dosis (3 dosis si la 3 ^{ra} dosis se da a partir de los 4 años) <ul style="list-style-type: none"> • Toda dosis final administrada a partir del 7 de agosto del 2009, debe darse por lo menos a los 4 años de edad y con un mínimo intervalo de 6 meses a partir de la dosis previa. 	4 dosis (3 dosis <i>si</i> la tercera dosis se da a partir de los 4 años)		
Sarampión, Paperas y Rubéola	2 dosis			
Varicela	2 dosis O El proveedor de salud verifica que se padeció la enfermedad.		1 dosis O Un padre de familia verifica la enfermedad.	Recomendada pero no requerida.

- Para información sobre la edad y espacio mínimos recomendados, vea la tabla de *Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas* en la página 2.
- Para más información detallada, revise el Sumario de los Requisitos de Vacunación Individuales en www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-284-IndividualVaccineRequirements.pdf (disponible solamente en inglés).

Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas

Vacunas	Núm. de dosis	Edad mínima	Intervalo mínimo entre dosis	Notas
Hepatitis B HepB	Dosis 1	Nacimiento	4 semanas entre dosis 1 y 2 (K-12º)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenga en cuenta los cambios en la edad e intervalos mínimos para el año escolar 2013-14. ▪ Las 2 dosis son validas si la vacuna Recombivax HB® para adultos es administrada entre las edades de 11 y 15 años espaciadas por 4 meses o más.
	Dosis 2	4 semanas	8 semanas entre dosis 2 y 3 (K-12º)	
	Dosis 3	24 semanas (K- 6º grado) 4 meses (7º -12º grado)	16 semanas entre dosis 1 y 3 (K-6º) No intervalo mínimo entre la dosis 1 y la dosis 3 (7º-12º)	
Difteria, Tétanos y Tos ferina DTaP/DT	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DTaP: para niños hasta la edad de 6 años. ▪ Se recomienda un espacio de 6 meses entre dosis 3 y 4, pero un espacio de 4 meses o más es aceptable.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	6 mese entre dosis 4 y 5	
	Dosis 5	4 años	–	
Tétanos, difteria y tos ferina Tdap	Dosis 1	10 años (la edad mínima depende de la marca de vacuna)	–	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boostrix®: autorizada para personas de los 10 años de edad en adelante; ▪ Adacel®: autorizada para personas de los 11 años de edad en adelante. ▪ Puede administrarse sin importar el intervalo entre las vacunas DTaP o Td. ▪ Los estudiantes de 7 a 10 años de edad que no han sido vacunados completamente con la vacuna DTaP o Td deberán obtener una dosis de la vacuna Tdap seguida de dosis adicionales de la vacuna Td, si fuera necesario.
Tétanos y difteria Td	Dosis 1	7 años	5 años	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Td: para niños a partir de los 7 años de edad. ▪ Se requieren 3 dosis de la vacuna Td si comenzaron la serie a partir de los 7 años, de preferencia con una dosis única de Tdap como primera dosis.
Polio IPV u OPV	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No es obligatoria para los estudiantes a partir de los 18 años de edad. ▪ Si un estudiante obtuvo todas las dosis antes del 7 de agosto del 2009, un intervalo mínimo de 4 semanas tiene que haber separado todas las dosis y la edad mínima es de las 18 semanas en adelante.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	4 años	–	
Sarampión, Paperas y Rubéola MMR o MMRV	Dosis 1	12 meses	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La vacuna MMRV (MMR + varicela) puede usarse en lugar de las vacunas MMR y varicela por separado. ▪ El periodo de gracia de 4 días APLICA entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como MMR/MMR o MMRV/MMRV. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR y gripe atenuada.
	Dosis 2	13 meses	–	
Varicela VAR	Dosis 1	12 meses	3 mese entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se recomienda un espacio de 3 meses entre las dosis de varicela, pero un promedio mínimo de 28 días es aceptable. ▪ Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna MMR o por lo menos 28 días aparte (NO aplica el periodo de gracia de 4 días). ▪ El periodo de gracia de 4 días APLICA entre las dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como VAR and VAR.
	Dosis 2	15 meses	–	

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (1-800-833-6388 relevador TTY).